

アレンドロン酸錠5mg「YD」 のみ方とご注意

このお薬は毎朝1回1錠のむお薬です。

お薬の効果を最大限に引き出し、口の中と食道の副作用を減らすために、次の「のみ方」を必ず守ってください。

- 毎朝、起きてすぐ(食事の30分以上前)に、1錠をコップ1杯(約180mL)の水道水かぬるま湯でかまずにのんでください。
- のんでから30分間は横にならないでください。
- のんでから30分間は、水道水・ぬるま湯以外の飲食をさけ、他のお薬をのまないでください。
- このお薬をかんだり、口の中で溶かしたりしないでください。

(裏面に続く)

ご注意

このお薬は**ビスホスホネート系薬剤**です。

- 口の中を清潔に保ってください。
- のみ込みにくく感じたり、のみ込むときの痛み、胸の痛みや胸やけのような症状に気づいた場合には、服用を中止し、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。
- もし、のみ忘れた場合には、その日はのまないで、翌朝に1錠をのんでください。**決して同じ日に2錠のまないでください。**
- 歯医者さんで診察を受ける時は、必ずこの紙を**みせてください。

製造販売元



株式会社 **陽進堂**

富山県富山市婦中町萩島3697番地8号

A99078KN
A001