



—大切な注意です。必ずお読みください—

クロピドグレル錠「YD」を服用される患者さんへ

このお薬の服用にあたっては、医師・薬剤師の指示に従い、薬の飲み方を守ってください。

このお薬を飲んで、いつもと違う以下のような症状に気がいたら、ただちに医師または薬剤師に連絡し、指示に従ってください。

- 白眼が黄色くなる
- ぶつぶつが出る、皮膚が黄色くなる、あざができる (紫色・赤色)
- 鼻や歯ぐきから出血する
- 尿が茶色っぽくなる、尿に血が混じる
- 熱が出る (37℃以上)、さむけがする、のどが痛む
- 強い疲労感を感じる、食欲がなくなる、吐き気がする、おなかが張る、意識が低下する (うとうとする)

このお薬は血栓 (血のかたまり) ができて血管がつまるのを防ぐお薬です。

- 1日1回服用してください。
- 飲み忘れたとしても、次の日に2回分を一度に服用しないでください。
- 医師の指示を守って服用してください。

医療機関名

 陽進堂ホールディングス株式会社

D・02・0426



—大切な注意です。必ずお読みください—

クロピドグレル錠「YD」を服用される患者さんへ

このお薬の服用にあたっては、医師・薬剤師の指示に従い、薬の飲み方を守ってください。

このお薬を飲んで、いつもと違う以下のような症状に気がいたら、ただちに医師または薬剤師に連絡し、指示に従ってください。

- 白眼が黄色くなる
- ぶつぶつが出る、皮膚が黄色くなる、あざができる (紫色・赤色)
- 鼻や歯ぐきから出血する
- 尿が茶色っぽくなる、尿に血が混じる
- 熱が出る (37℃以上)、さむけがする、のどが痛む
- 強い疲労感を感じる、食欲がなくなる、吐き気がする、おなかが張る、意識が低下する (うとうとする)

このお薬は血栓 (血のかたまり) ができて血管がつまるのを防ぐお薬です。

- 1日1回服用してください。
- 飲み忘れたとしても、次の日に2回分を一度に服用しないでください。
- 医師の指示を守って服用してください。

医療機関名

 陽進堂ホールディングス株式会社

D・02・0426



—大切な注意です。必ずお読みください—

クロピドグレル錠「YD」を服用される患者さんへ

このお薬の服用にあたっては、医師・薬剤師の指示に従い、薬の飲み方を守ってください。

このお薬を飲んで、いつもと違う以下のような症状に気がいたら、ただちに医師または薬剤師に連絡し、指示に従ってください。

- 白眼が黄色くなる
- ぶつぶつが出る、皮膚が黄色くなる、あざができる (紫色・赤色)
- 鼻や歯ぐきから出血する
- 尿が茶色っぽくなる、尿に血が混じる
- 熱が出る (37℃以上)、さむけがする、のどが痛む
- 強い疲労感を感じる、食欲がなくなる、吐き気がする、おなかが張る、意識が低下する (うとうとする)

このお薬は血栓 (血のかたまり) ができて血管がつまるのを防ぐお薬です。

- 1日1回服用してください。
- 飲み忘れたとしても、次の日に2回分を一度に服用しないでください。
- 医師の指示を守って服用してください。

医療機関名

 陽進堂ホールディングス株式会社

D・02・0426



—大切な注意です。必ずお読みください—

クロピドグレル錠「YD」を服用される患者さんへ

このお薬の服用にあたっては、医師・薬剤師の指示に従い、薬の飲み方を守ってください。

このお薬を飲んで、いつもと違う以下のような症状に気がいたら、ただちに医師または薬剤師に連絡し、指示に従ってください。

- 白眼が黄色くなる
- ぶつぶつが出る、皮膚が黄色くなる、あざができる (紫色・赤色)
- 鼻や歯ぐきから出血する
- 尿が茶色っぽくなる、尿に血が混じる
- 熱が出る (37℃以上)、さむけがする、のどが痛む
- 強い疲労感を感じる、食欲がなくなる、吐き気がする、おなかが張る、意識が低下する (うとうとする)

このお薬は血栓 (血のかたまり) ができて血管がつまるのを防ぐお薬です。

- 1日1回服用してください。
- 飲み忘れたとしても、次の日に2回分を一度に服用しないでください。
- 医師の指示を守って服用してください。

医療機関名

 陽進堂ホールディングス株式会社

D・02・0426