

プレガバリンOD錠「YD」服用時の注意

疼痛治療剤と呼ばれる神経の痛みに対するお薬です



- ◇1週間以上服用を続けることで効果を発揮しますので、必ず医師や薬剤師の指示に従って服用してください。
- ◇このお薬は水なしでも服用できますが、苦味を感じる場合は、水で服用することもできます。
- ◇めまい、眠気、意識消失等があらわれることがありますので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作はお控えください。また、高齢の方は転倒に注意してください。
- ◇アルコール（飲酒）によって効果が強くなることがありますので飲酒はお控えください。
- ◇急に服用を中止すると、不眠、頭痛、吐き気、下痢などの症状があらわれることがあるので、服用量や回数についてはご自身で判断せず、必ず医師や薬剤師にご相談ください。
- ◇他に服用中のお薬がある場合は、医師や薬剤師にお知らせください。

気になる症状があらわれたときやわからないことがあるときは
ご自身で判断せず、医師や薬剤師にご相談ください。

プレガバリンOD錠「YD」服用時の注意

疼痛治療剤と呼ばれる神経の痛みに対するお薬です



- ◇1週間以上服用を続けることで効果を発揮しますので、必ず医師や薬剤師の指示に従って服用してください。
- ◇このお薬は水なしでも服用できますが、苦味を感じる場合は、水で服用することもできます。
- ◇めまい、眠気、意識消失等があらわれることがありますので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作はお控えください。また、高齢の方は転倒に注意してください。
- ◇アルコール（飲酒）によって効果が強くなることがありますので飲酒はお控えください。
- ◇急に服用を中止すると、不眠、頭痛、吐き気、下痢などの症状があらわれることがあるので、服用量や回数についてはご自身で判断せず、必ず医師や薬剤師にご相談ください。
- ◇他に服用中のお薬がある場合は、医師や薬剤師にお知らせください。

気になる症状があらわれたときやわからないことがあるときは
ご自身で判断せず、医師や薬剤師にご相談ください。