

レニン・アンジオテンシン系阻害薬を使用する 女性の患者さんへ

妊婦又は妊娠している可能性のある女性は、
医師に相談してください。

- 妊娠中に使用した場合、胎児・新生児に影響を及ぼす可能性があります。
- 妊娠が判明した場合又は疑われる場合（月経遅延、つわり症状、基礎体温を測定している場合は高温期の持続など）は、医師に相談してください。
- 妊娠を計画する場合は、医師に相談してください。

医師は、このお薬を患者さんに必要と判断して処方しています。医師に相談なくお薬の使用を中止することのないようにお願いします。

妊娠と薬情報センター
はこちら

妊娠中や妊娠希望の方のお薬に関する相談窓口として
「妊娠と薬情報センター」があります。



レニン・アンジオテンシン系阻害薬を使用する 女性の患者さんへ

妊婦又は妊娠している可能性のある女性は、
医師に相談してください。

- 妊娠中に使用した場合、胎児・新生児に影響を及ぼす可能性があります。
- 妊娠が判明した場合又は疑われる場合（月経遅延、つわり症状、基礎体温を測定している場合は高温期の持続など）は、医師に相談してください。
- 妊娠を計画する場合は、医師に相談してください。

医師は、このお薬を患者さんに必要と判断して処方しています。医師に相談なくお薬の使用を中止することのないようにお願いします。

妊娠と薬情報センター
はこちら

妊娠中や妊娠希望の方のお薬に関する相談窓口として
「妊娠と薬情報センター」があります。



下記のお薬(降圧薬)を使用する
女性の患者さんご注意ください。

アンジオテンシン変換酵素阻害薬

- イミダプリル塩酸塩錠「YD」

アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 (ARB)

- オルメサルタン錠「YD」
- カンデサルタン錠「YD」
- テルミサルタン錠「YD」
- ロサルタンカリウム錠「YD」

ARB含有配合剤

- アムバロ配合錠「YD」
- イルアミクス配合錠「YD」
- ジルムロ配合錠「YD」
- ロサルヒド配合錠「YD」

下記のお薬(降圧薬)を使用する
女性の患者さんご注意ください。

アンジオテンシン変換酵素阻害薬

- イミダプリル塩酸塩錠「YD」

アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 (ARB)

- オルメサルタン錠「YD」
- カンデサルタン錠「YD」
- テルミサルタン錠「YD」
- ロサルタンカリウム錠「YD」

ARB含有配合剤

- アムバロ配合錠「YD」
- イルアミクス配合錠「YD」
- ジルムロ配合錠「YD」
- ロサルヒド配合錠「YD」