

2026年9月

医療関係者各位

陽進堂ホールディングス株式会社

「使用上の注意」改訂のお知らせ

HMG-CoA 還元酵素阻害剤

—脂質異常症治療剤—

日本薬局方 シンバスタチン錠

シンバスタチン錠 5mg 「YD」
シンバスタチン錠 10mg 「YD」
シンバスタチン錠 20mg 「YD」

今般、自主改訂により下記の通り使用上の注意事項を変更致しましたので、お知らせ申し上げます。
(下線部分が変更箇所です。)

ご使用に際しましては、下記改訂内容をご参照賜りますようお願い申し上げます。

記

〈改訂内容〉

改訂後			改訂前（部：削除）		
2.禁忌（次の患者には投与しないこと） 2.1～2.3 変更なし 2.4 イトラコナゾール、ミコナゾール、ボサコナゾール、アタザナビル、コビシスタットを含有する製剤、セリチニブ、 <u>ロナファルニブ</u> を投与中の患者 [10.1 参照]			2.禁忌（次の患者には投与しないこと） 2.1～2.3 省略 2.4 イトラコナゾール、ミコナゾール、ボサコナゾール、アタザナビル、 <u>サキナビルメシル酸塩</u> 、コビシスタットを含有する製剤、セリチニブを投与中の患者 [10.1 参照]		
10.相互作用 変更なし 10.1 併用禁忌（併用しないこと）			10.相互作用 省略 10.1 併用禁忌（併用しないこと）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
変更なし			省略		
アタザナビル： レイアタツ コビシスタット を含有する製 剤： ゲンボイヤ プレジコビッ クス シムツーザ セリチニブ： ジカディア <u>ロナファルニ ブ：</u> <u>ゾキンヴィ</u> [2.4 参照]	横紋筋融解症を 含むミオパチー 等の重篤な副作 用が起きるおそ れがある。	これらの薬剤は CYP3A4 を阻害 し、本剤の代謝 が抑制される。	アタザナビル： レイアタツ <u>サキナビルメシ ル酸塩：</u> <u>インビラーゼ</u> コビシスタット を含有する製 剤： ゲンボイヤ プレジコビッ クス シムツーザ セリチニブ： ジカディア [2.4 参照]	横紋筋融解症を 含むミオパチー 等の重篤な副作 用が起きるおそ れがある。	これらの薬剤は CYP3A4 を阻害 し、本剤の代謝 が抑制される。
10.2 併用注意（併用に注意すること） 変更なし			10.2 併用注意（併用に注意すること） 省略		

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。—

〈改訂理由〉

●「2.禁忌」及び「10.1 併用禁忌」の改訂

先発製剤において相互作用相手薬である「ロナファルニブ」との整合に伴う追記が行われたため、本剤も同様に改訂して注意喚起することといたしました。また、「サキナビルメシル酸塩」が販売中止されていることから、記載を削除いたしました。

- DSU No.349(2026 年 10 月発行)掲載予定

- 最新の電子添文につきましては、以下ホームページをご参照ください。

陽進堂ホールディングスホームページの医療関係者様向けサイト(<https://yoshindoholdings.co.jp/>)

医薬品医療機器総合機構のホームページ(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)

- 専用アプリ「添文ナビ」を用いて GS1 バーコードを読み取ることで、電子添文を確認頂くこともできます。

シンバスタチン錠「YD」の GS1バーコード



お問い合わせは、担当 MR 又は弊社お客様相談室までご連絡ください。
陽進堂ホールディングス株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-647-734

以上